

- ✓ Atténue la mauvaise haleine
- ✓ Réduit la formation de plaque et de tartre
- ✓ Sans danger et facile à utiliser

Il a été démontré que l'extrait de thé vert permettait de combattre la plaque dentaire.

- Offrez-le aux propriétaires d'animaux pour un traitement quotidien à domicile.

Une évaluation clinique de trois semaines a été effectuée sur quinze chiens de race croisée et cinq chats.¹

Selon les résultats :

- Les chiens et les chats ont tous deux bien accepté le produit.
- Les propriétaires ont observé une réduction marquée de la mauvaise haleine.
- La plupart des propriétaires ont signalé une amélioration de la couleur des gencives.
- Tous voulaient continuer à utiliser ce produit.

¹Étude menée et supervisée par le Dr Peter Emily.



Extrait de thé vert
Réduit la formation de plaque

Emilgase (enzyme)
Réduit la formation de plaque

Gluconate de zinc
Stimulant immunitaire/
Purifie l'haleine

Gluconate de chlorhexidine
Agent de conservation

Gluconate de chlorhexidine
Antiseptique

	Breathalyser Avec thé vert 250 mL	Breathalyser Avec thé vert 500 mL	Breathalyser Rince-bouche Chlorhexidine 237 mL
WDC	121902	121900	121901
AVP	8920213	8920214	8920208
MVP	4510184	4510185	4510183
DVS	120032	120033	120031
CDMV	110877	110876	110878
VP	4760110	4760120	4760300

Le rince-bouche Gluconate de chlorhexidine 0,12 % est un antiseptique buccal efficace.

- Utilisez-le tous les jours pour préparer l'animal qui a une carie avant une chirurgie dentaire.
- Offrez-le aux propriétaires d'animaux pour un traitement immédiat post-chirurgie et pendant 2 semaines après la chirurgie.



Breathalyser®

Une gamme complète d'options de traitement dentaire sans danger et efficaces pour votre clinique vétérinaire et vos patients.

imRex

Spécialisé dans la santé dentaire chez les animaux

ImRex Inc, 1550 Yorkton Court, Burlington, Ontario, Canada L7P 5B7
www.imrex.ca

3 façons d'incorporer ces produits à vos activités quotidiennes à la clinique:

1. Préparation à la chirurgie :

Rince-bouche chlorhexidine 0,12 % Breathalyser selon le mode d'emploi sur l'étiquette

2. Traitement post-chirurgie:

Rince-bouche chlorhexidine 0,12 % Breathalyser	2 gouttes par jour
Gel nettoyant buccal Breathalyser	2 doses par jour
Additif pour l'eau Breathalyser	Tous les jours
Analgésique	Au besoin
Antibiotiques	Au besoin

3. Pendant 2 semaines après le traitement :

Rince-bouche chlorhexidine 0,12 % Breathalyser	2 gouttes par jour
Gel nettoyant buccal Breathalyser	2 doses par jour
Additif pour l'eau Breathalyser	Tous les jours
Dentifrice Breathalyser	Tous les jours
Gâterie dentaire	Tous les jours

Aidez à sensibiliser les propriétaires d'animaux à l'importance de la santé dentaire. Visitez notre site Web pour plus d'information sur la santé bucco-dentaire.

www.imrex.ca

